


# Separación por Sexo en la Cría de Pollos de Engorde para Mejorar la Eficiencia y Reducir la Densidad



En general, los pollos de engorde son tanto machos como hembras y se crían conjuntamente durante todo el periodo de engorde. En esta práctica, los machos y las hembras se cría de forma separada en una misma nave. Las hembras se engordan hasta la tercera o cuarta semana de vida, y los machos hasta la sexta semana de vida o el peso final objetivo. Es una forma de reducir las densidades cuando los pollos son mayores y de mejorar la eficiencia dadas en las capacidades diferenciales de crecimiento y conversión de los dos sexos. La separación de hembras y machos se realiza instalando una valla en la nave. Una vez que se han retirado las hembras, se quita esta valla y los machos pueden usar todo el área del gallinero. Por un lado, la separación facilita la retirada de las hembras, que tal y como se ha dicho, tiene lugar semanas antes que la de los machos. Por otro lado, se reduce el estrés de los machos. Además, la densidad de los animales se puede calcular mejor después de que se ha retirado a las hembras, ya que la intensidad de crecimiento es más homogénea y la uniformidad del peso corporal puede ser mayor que cuando se crían animales de ambos sexos. La separación por sexo se puede aplicar tanto a estirpes de pollos de crecimiento rápido como a las de crecimiento más lento.

PARTICIPATING IN

eip-agri  
AGRICULTURE & INNOVATION