

Alimentación de un neonato

- **Calostro** es extremadamente importante para el neonato porque proporciona anticuerpos para protegerlo frente a las enfermedades y nutrientes esenciales.
- Si la madre no tiene calostro disponible o es insuficiente, hay que ofrecerle de otra oveja; otra alternativa es el calostro congelado de ovino o vacuno, calentado a temperatura corporal, y ofrecido en biberón o botella.
- Los corderos neonatos deben alimentarse cada 2-3 horas durante las 2 primeras semanas de vida (durante la noche se puede hacer cada 4 o 5 horas), y después cada 4 horas durante las siguientes semanas, dependiendo de qué tal vayan evolucionando.

Es importante asegurarse de que el cordero mame en su primera hora de vida



Alimentando al cordero

Los programas para alimentar corderos dependen de varios factores: sistema de producción, opciones de mercado, localización geográfica, coste y disponibilidad de alimento.

Los corderos que nacen en invierno a menudo se alimentan y se finalizan con dietas ricas en concentrados, mientras que los que nacen más tarde a menudo se crían en pasto con sus madres. Algunos programas de alimentación usan tanto pasto como cereal.

Durante las primeras semanas de vida de los corderos, necesitan nutrirse con la leche de su madre. Para cuando tienen 4-6 semanas de vida, pueden obtener hasta el 50% de sus nutrientes de otros recursos aparte de la leche de su madre.



Alimentación con pienso (Creep Feeding)

Creep feeding es una forma de ofrecer, generalmente grano, a los corderos lactantes. Es especialmente útil para los corderos de sistemas de producción intensivo.

Se debe comenzar con este sistema a la semana 1-2 de edad, ofreciendo alimento seco para estimular el desarrollo del rumen.

Finalización de corderos en lotes

Los corderos criados a pasto se llevan a una dieta rica en concentrado-baja en forraje. Hay que hacerlo de forma gradual durante varias semanas.


Cuando se finalizan los corderos con dietas ricas en cereales, se pueden producir problemas de acidosis, enterotoxemia, y cálculos renales. Se puede prevenir la acidosis incluyendo al menos un 10% de forraje en la dieta, ofreciendo un buffer (por ejemplo bicarbonato sódico), y evitando cambios bruscos en el tipo o cantidad de dieta suministrada.

Finalización de corderos en base a pasto

Los corderos alimentados con pasto no suelen crecer tan rápido como los alimentados con dietas ricas en concentrados, si bien resulta más económico.

Los sistemas de pastoreo rotacional permiten que los corderos consuman plantas en estado vegetativo, cuando están en un momento más apetecible y son más nutritivas.

Lactancia Artificial de Corderos



Nodriz automática	
Ventajas	Desventajas
Menor necesidad de trabajo Tasas de crecimiento muy altas Ofrece acceso constante a leche templada	Es crucial un mantenimiento regular, incluyendo el calibrado semanal
	Inversión: Alta



Destete

Es un momento clave en el manejo de los corderos.

Excepto en la lactancia artificial, el destete incluye la separación de la madre y el abandono de la dieta líquida. Por eso suele ser un momento de stress para ambos, oveja y cordero. Y es fundamental tratar de minimizar ese stress al destete.



Consejos para el destete

- Ninguna edad es **"la mejor"** para el destete. La edad al destete varía dependiendo del sistema de producción (hasta 4 meses) y depende de muchos factores incluyendo los objetivos de mercado, condición física, disponibilidad de pasto y alimento.
- Planifique el protocolo de destete, tiempo e instalaciones 15 días antes del destete.
- Los corderos deberían estar vacunados antes del destete, especialmente frente a **clostridios**.
- Los corderos deben haber triplicado al menos su peso al nacimiento (no menos de 10kg), y estar comiendo sólido y bebiendo agua por sí mismos. Al destete, ir reduciendo la oferta de leche durante varias semanas antes de quitarla del todo: un destete progresivo es menos estresante para el cordero.
- Ofrecer hierba de buena calidad a los 10 días, y pellets o cereal después de los 21 días de edad. El alimento sólido es necesario para el desarrollo del rumen.
- Proporcione alimentos ricos en proteína.
- En el caso de destete precoz, es crítico considerar la capacidad del cordero para comer suficiente cantidad de pienso concentrado.
- Para reducir el stress del cordero, convendría mover a las ovejas a otro sitio, en lugar de mover a los corderos..
- Se debería mantener a las ovejas con una dieta de baja calidad para facilitar el secado.